








MESURES DE BASE, QUAND?

Appliquées en toute situation, par tout professionnel, vis-à-vis de tout patient, y compris en cas de Mesures spécifiques

<p>HYGIÈNE DES MAINS</p> 	<p>GANTS DE SOINS</p> 	<p>MASQUE MÉDICAL</p> 	<p>PROTECTION OCULAIRE</p> 	<p>TABLIER IMPERMÉABLE</p>  OU SURBLOUSE ÉTANCHE (BLEUE) 
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Avant de toucher un patient 2. Avant un geste aseptique (contact avec muqueuse, peau non intacte, dispositif médical invasif) 3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique 4. Après avoir touché un patient 5. Après avoir touché un objet de l'environnement du patient 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le contact anticipé avec un liquide biologique (avec muqueuse et peau non intacte inclus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la procédure à risque d'éclaboussure d'un liquide biologique • En cas de symptômes respiratoires chez le patient ou chez le professionnel • Porté par le patient dans les espaces communs, lorsque l'Hygiène Respiratoire est activée 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la procédure à risque d'éclaboussure d'un liquide biologique 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la procédure à risque d'éclaboussure d'un liquide biologique • Pour le contact anticipé avec une grande quantité de liquide biologique

Equipements et dispositifs médicaux

- À désinfecter après usage